



**ANGIOGRAPHIE  
RÉTINIENNE**



CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE  
DES LAURENTIDES

Si vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à votre rendez-vous, veuillez nous appeler **au moins 24 heures à l'avance.**



Clinique d'ophtalmologie des Laurentides  
6110, rue Doris-Lussier, Bureau 301  
Boisbriand, Québec  
J7H 0E8

Téléphone: **450.419.6345** ou  
**1.888.419.6345**  
Télécopieur: **450.434.9389**  
[institutdeloeil.com](http://institutdeloeil.com)



## ANGIOGRAPHIE RÉTINIENNE

### DÉFINITION

L'angiographie rétinienne consiste à visualiser et à étudier votre circulation sanguine rétinienne.

Grâce à l'injection d'une solution de contraste (colorant) appelée fluorescéine, il est possible de localiser les fuites ou les blocages de votre circulation sanguine.

### PRÉPARATION:

- Une infirmière vous explique l'examen, note vos allergies et vous fait signer un consentement.
- Vos pupilles sont dilatées avec des gouttes.
- On installe une aiguille sur une veine de votre bras afin de permettre à l'infirmière d'injecter la fluorescéine.
- Votre tension artérielle et votre pouls sont monitorés.

## DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

- Vous êtes assis. Votre front et votre menton sont bien appuyés contre le support de la caméra OCT-Angio.
- La technicienne vous donne des consignes claires tout au long de l'examen.
- Des photos sont prises et 2 ml de fluorescéine est injecté dans votre bras.
- La durée de l'examen est d'environ 5 minutes.
- Si un malaise survient pendant le traitement, avisez immédiatement l'infirmière.
- Après l'examen, vous restez sous observation pour une trentaine de minutes. L'infirmière vérifie votre tension artérielle et votre pouls.

## APRÈS L'EXAMEN :

- La dilatation de vos pupilles dure habituellement de 6 à 12 heures. Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la vision. Par conséquent, attendez le lendemain avant de conduire.
- Votre peau a une coloration jaunâtre (de 12 à 24 heures).

- Vos urines sont plus foncées (de 24 à 36 heures).
- Buvez beaucoup d'eau afin d'éliminer le colorant (fluorescéine).
- L'ophtalmologiste vous explique (le jour même ou lors d'un rendez-vous ultérieur), le résultat de l'angiographie de même que le traitement à envisager (si nécessaire). N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions.
- Un prochain rendez-vous est organisé selon le besoin.

## EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

Quelquefois (rarement), les effets secondaires suivants sont ressentis :

- Bouffée de chaleur.
- Étourdissement.
- Nausée.

Exceptionnellement (très rarement), vous pouvez être allergique à la fluorescéine. Un traitement spécifique peut alors être nécessaire.

## URGENCE


**450.419.6345**

**1.888.419.6345**

**Consultez-nous IMMÉDIATEMENT si vous constatez l'une des situations suivantes :**

- Vous développez des démangeaisons.
- Vous enflez.
- Vous éprouvez des difficultés à respirer.

## POUR NOUS JOINDRE



Clinique d'ophtalmologie des Laurentides  
6110, rue Doris-Lussier, Bureau 301  
Boisbriand, Québec  
J7H 0E8

Téléphone : 450.419.6345 ou  
1.888.419.6345

\* Tous les prix sont sujets  
à changement sans préavis.

Version novembre 2020



CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE  
DES LAURENTIDES