


CAPSULOTOMIE AU LASER



CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE
DES LAURENTIDES

Si vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à votre rendez-vous, veuillez nous appeler **au moins 24 heures à l'avance** au **450.419.6345**.



Clinique d'ophtalmologie des Laurentides
6110, rue Doris-Lussier, bureau 301
Boisbriand, Québec
J7H 0E8

Téléphone: **450.419.ŒIL (6345)** ou
1.888.419.ŒIL (6345)
Télécopieur: **450.434.YEUX (9389)**
institutdeloeil.com



CAPSULOTOMIE AU LASER

DÉFINITION

Après une chirurgie de la cataracte, il arrive parfois qu'une membrane opaque « cataracte secondaire » se forme. Elle résulte de la perte progressive de la transparence de l'enveloppe du cristallin.

Lors de la chirurgie de la cataracte, cette enveloppe est conservée, car elle sert de support naturel pour la lentille intraoculaire insérée dans votre oeil.

Les symptômes visuels provoqués par cette opacification sont semblables à ceux de la cataracte (vision diminuée, embrouillée).

Avec le laser Nd : YAG, une ouverture est faite dans la capsule pour éclaircir votre vision.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT :

- Un membre du personnel vous explique le traitement et vous fait signer un consentement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
- Une goutte pour dilater la pupille est habituellement instillée dans votre oeil à 1 ou 2 reprises.
- Vous êtes assis face au laser.
- Une goutte anesthésiante est instillée dans votre oeil avant le traitement.
- Un verre de contact spécial est placé sur votre oeil.
- Vous ne ressentirez aucune douleur durant le traitement.
- Dans la plupart des cas, un seul traitement est nécessaire pour éclaircir définitivement votre vision.

APRÈS LE TRAITEMENT :

- Normalement, vous ne ressentirez aucune douleur après le traitement.
- La dilatation de la pupille dure habituellement de 6 à 12 heures. Cette dilatation occasionne temporairement un embrouillement de la vision. Par conséquent, si les 2 yeux sont traités en même temps, attendez le lendemain avant de conduire.
- Votre vision s'améliorera dès le lendemain de l'intervention. La vision finale sera en fonction de l'état de santé de votre oeil.
- Quelquefois, des gouttes anti-inflammatoires sont prescrites par l'ophtalmologiste.
- Un prochain rendez-vous sera organisé.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES :

- Quelques points noirs flottants sont fréquents après le traitement et peuvent parfois persister.

URGENCE

450.419.6345


1.888.419.6345

Consultez-nous RAPIDEMENT si :

- vous constatez de nombreux points noirs avec flashes qui apparaissent soudainement.

POUR NOUS JOINDRE

**CLINIQUE D'OPHTALMOLOGIE
DES LAURENTIDES**



**Semaine
(du lundi au vendredi)**

À la Clinique d'ophtalmologie
des Laurentides
au **450.419.6345** ou
1.888.419.6345

**Clinique d'ophtalmologie
des Laurentides**

6110, rue Doris-Lussier
bureau 301
Boisbriand, QC, J7H 0E8

* Tous les prix sont sujets à changement sans préavis.

